

Parte II: Lógica Proposicional

21 de octubre de 2016

Semántica

- Las asignaciones son funciones en $\mathcal{V} \rightarrow \{0, 1\}$.
- Dada una asignación f , definimos la semántica $\llbracket - \rrbracket_f: Prop \rightarrow \{0, 1\}$.
- Una proposición P es tautología si para toda asignación f , $\llbracket P \rrbracket_f = 1$.
- Una asignación f es de $\Gamma \subseteq Prop$, si para toda $Q \in \Gamma$, $\llbracket Q \rrbracket_f = 1$.
- Decimos que P es consecuencia lógica de Γ , $\Gamma \models P$, si para toda f de Γ , se da que $\llbracket P \rrbracket_f = 1$.

Deducción natural

- Necesidad de formalizar los esquemas de razonamiento válido.
- Reglas de inferencia para construir derivaciones a partir de hipótesis.
- Definición por inducción del conjunto \mathcal{D} de derivaciones.
- Decimos que Q se deduce de Γ , $\Gamma \vdash Q$, si existe una derivación D tal que $hip(D) \subseteq \Gamma$ y $concl(D) = Q$.
- Las reglas sólo nos permiten inferir conclusiones válidas a partir de premisas válidas: $\Gamma \vdash Q$ implica $\Gamma \models Q$.

El plan de la clase de hoy

- Queremos probar $\Gamma \models P$ implica $\Gamma \vdash P$.
- Si $\Gamma \models P$, entonces no existe ninguna asignación de $\Gamma \cup \{\neg P\}$.
- Si no existe f de $\Gamma \cup \{\neg P\}$, entonces $\Gamma \cup \{\neg P\} \vdash \perp$. ¡Esto es lo difícil!
- Por lo tanto, $\Gamma \vdash P$ por *RAA*.

InConsistencia

- Un conjunto $\Gamma \subseteq Prop$ es **inconsistente** si $\Gamma \vdash \perp$.
- ¿Ejemplos de inconsistentes?
- Un conjunto $\Gamma \subseteq Prop$ es *consistente* si $\Gamma \not\vdash \perp$.
- La definición de inconsistente es equivalente a estas otras.
Sea $\Gamma \subseteq Prop$, Γ es inconsistente si y sólo si
Existe $P \in Prop$ tal que $\Gamma \vdash P$ y $\Gamma \vdash \neg P$.
Para toda $P \in Prop$, $\Gamma \vdash P$.

Consecuencias de inconsistencia

- Si $\Gamma \cup \{\neg P\} \vdash \perp$, entonces $\Gamma \vdash P$.
 Sea D tal que $hip(D) \subseteq \Gamma \cup \{\neg P\}$ y $concl(D) = \perp$, entonces construimos la siguiente derivación:

$$\begin{array}{c}
 [\neg P] \\
 \vdots \\
 D \quad \perp \text{ hacer el práctico} \\
 \vdots \\
 P
 \end{array}$$

- Si $\Gamma \cup \{P\} \vdash \perp$, entonces $\Gamma \vdash \neg P$.

Criterios de consistencia

- ¿Cómo podemos saber si un conjunto Γ es consistente?
- Es decir tenemos que ver $\Gamma \not\vdash \perp$.
- Para probar que \emptyset es consistente (es decir $\not\vdash \perp$), usamos la contra-recíproca de corrección.
- Si existe una asignación f de Γ , entonces Γ es consistente.

Sea f una asignación de Γ y supongamos $\Gamma \vdash \perp$ (para llegar a una contradicción). Entonces $\llbracket \perp \rrbracket_f = 1$: la contradicción que buscábamos. Por lo tanto $\Gamma \not\vdash \perp$.

- $\{p_0, \neg p_1, p_2, \neg p_3, \dots, p_{2*k}, \neg p_{2*k+1}, \dots\}$ es consistente.
- Para ver que un conjunto Γ es inconsistente, debemos mostrar $\Gamma \vdash \perp$!

Consistentes maximales

- ¿Será cierta la vuelta del criterio de consistencia?
- Sea Γ es consistente, ¿existe una asignación de Γ ?
- ¿Por qué es importante esta pregunta?
- Supongamos que $\Gamma \cup \{\neg P\}$ no tiene una asignación. Entonces $\Gamma \cup \{\neg P\}$ es inconsistente: $\Gamma \cup \{\neg P\} \vdash \perp$. Por lo tanto, $\Gamma \vdash P$.
- Un conjunto $\Gamma \subseteq Prop$ es *consistente maximal* si para todo Δ consistente, $\Gamma \subseteq \Delta$ implica $\Delta = \Gamma$.
- Prácticamente, Δ es consistente maximal si no existe $Q \notin \Delta$, tal que $\Delta \cup \{Q\}$ siga siendo consistente.

Consistentes maximales

- Los consistentes maximales son cerrados por derivación: si Δ es consistente maximal, entonces $\Delta \vdash P$ implica $P \in \Delta$.

Supongamos $P \notin \Delta$, entonces $\Delta \cup \{P\} \vdash \perp$, de otro modo Δ no sería maximal.

Por el ejercicio, sabemos $\Delta \vdash \neg P$; entonces $\Delta \vdash \perp$:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ P \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \neg P \end{array}}{\perp} \rightarrow E$$

Consistentes maximales

- Sea Δ un conjunto maximal, entonces Δ realiza los conectivos.

- Para toda $P \in Prop$, $P \notin \Delta$ si y sólo si $\neg P \in \Delta$.

Si $P \notin \Delta$, entonces $\Delta \vdash \neg P$, por lema anterior.

- $P \in \Delta$ y $Q \in \Delta$ si y sólo si $P \wedge Q \in \Delta$.

- Si $P \in \Delta$ implica $Q \in \Delta$, entonces $P \rightarrow Q \in \Delta$.

Supongamos $P \notin \Delta$, entonces $\neg P \in \Delta$.

$$\frac{\neg P \quad [P]_1}{\perp} \rightarrow E$$

$$\frac{\perp}{Q} \perp E$$

$$\frac{}{P \rightarrow Q} \rightarrow I_1$$

Supongamos $P \in \Delta$, entonces $Q \in \Delta$, por lo tanto

$$\frac{Q}{P \rightarrow Q} \rightarrow I$$

- Si $P \rightarrow Q \in \Delta$, entonces $P \in \Delta$ implica $Q \in \Delta$.

Es muy simple $\frac{P \rightarrow Q \quad P}{Q} \rightarrow E$

- En los tres casos concluimos que la proposición está en Δ , porque Δ es cerrado por derivaciones.

Consistentes maximales

- Supongamos que Δ es consistente maximal.
- Si sabemos que ciertas proposiciones están en Δ , entonces podemos saber que otras también están.
- Ejemplo: Si $P \in \Delta$, entonces $Q \rightarrow P \in \Delta$, para todo Q .
- Si Γ es consistente, entonces pueden existir varios Δ_i y consistentes maximales tales que $\Gamma \subseteq \Delta_i$.
- Ejemplo: \emptyset es consistente (¿por qué?) y hay muchos maximales que lo contienen.

Existencia de valuación

- Sea Δ consistente maximal, entonces para toda $P \in Prop$
o bien $P \in \Delta$ o bien $\neg P \in \Delta$.
- Si Δ es consistente maximal, entonces existe una asignación de Δ .
Definamos $f: \mathcal{V} \rightarrow \{0, 1\}$ de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll}
 f p_i = 1 & \text{si } p_i \in \Delta \\
 f p_i = 0 & \text{si } p_i \notin \Delta
 \end{array}$$

Probamos $\llbracket Q \rrbracket_f = 1$ si y sólo si $Q \in \Delta$, usando inducción en Q .

(At) Por definición de f y de $\llbracket - \rrbracket_f$.

Existencia de valuación

- $(P \rightarrow Q)$ Asumimos $\llbracket P \rrbracket_f = 1$ sii $P \in \Delta$ y $\llbracket Q \rrbracket_f = 1$ sii $Q \in \Delta$.
 Si $\llbracket P \rightarrow Q \rrbracket_f = 1$, entonces o bien $\llbracket Q \rrbracket_f = 1$, entonces $Q \in \Delta$ y $P \rightarrow Q \in \Delta$;
 o bien $\llbracket P \rrbracket_f = 0$, entonces $P \notin \Delta$; por lo tanto $\neg P \in \Delta$ y concluimos $P \rightarrow Q \in \Delta$.
 Si $P \rightarrow Q \in \Delta$, entonces $P \in \Delta$ implica $Q \in \Delta$.
 Si $P \in \Delta$, entonces $Q \in \Delta$ y por h.i. $\llbracket P \rightarrow Q \rrbracket_f = 1$.
 Si $P \notin \Delta$, entonces por h.i. $\llbracket P \rrbracket_f = 0$ y por lo tanto $\llbracket P \rightarrow Q \rrbracket_f = 1$.

Existencia de valuación

- $(P \wedge Q)$ Asumimos $\llbracket P \rrbracket_f = 1$ sii $P \in \Delta$ y $\llbracket Q \rrbracket_f = 1$ sii $Q \in \Delta$.
Si $\llbracket P \wedge Q \rrbracket_f = 1$, entonces tanto $\llbracket P \rrbracket_f = 1$ como $\llbracket Q \rrbracket_f = 1$, por h.i. en P y en Q , tenemos $P \in \Delta$ y $Q \in \Delta$, por lo tanto $P \wedge Q \in \Delta$.
Si $P \wedge Q \in \Delta$, entonces $P \in \Delta$ y $Q \in \Delta$. Por h.i. en P y en Q , $\llbracket P \rrbracket_f = \llbracket Q \rrbracket_f = 1$. Por lo tanto, $\llbracket P \wedge Q \rrbracket_f = 1$.

Extension a maximales

- Para ver que todo conjunto consistente Γ tiene una asignación, lo extendemos a uno maximal Γ^* .
Como las proposiciones son numerables, podemos pensarlas dadas por una lista infinita: P_0, P_1, P_2, \dots

$$\Gamma_0 = \Gamma$$

$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$$

$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{P_n\}$$

$$\text{si } \Gamma_n \cup \{P_n\} \vdash \perp$$

$$\text{si } \Gamma_n \cup \{P_n\} \not\vdash \perp$$

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$$

- Podemos probar que Γ^* es consistente maximal.

Γ^* es consistente maximal

- Γ_0 es consistente por hipótesis.
- Si Γ_n es consistente, entonces Γ_{n+1} es consistente.
- Si Γ^* es inconsistente, entonces existe k tal que Γ_k es inconsistente. Supongamos $\Gamma^* \vdash \perp$; la derivación D que muestra eso tiene necesariamente finitas hipótesis no canceladas. Si $\text{hip}(D) \subseteq \Gamma^*$, entonces $\text{hip}(D) \subseteq \Gamma_k$, para algún k . Pero esto es absurdo, pues mostramos que Γ_k es consistente.
- Para ver que es maximal, supongamos que $\Gamma^* \cup \{Q\}$ es consistente. Como Q aparecía en nuestra lista, digamos en la posición m , entonces $\Gamma_{m+1} = \Gamma_m \cup \{Q\}$ es consistente; por lo tanto $Q \in \Gamma^*$.

Recapitulando

- Si f es de Δ y $\Gamma \subseteq \Delta$, entonces f es de Γ .
- Como corolario de que todo maximal tiene una asignación, y de
- que todo consistente se extiende a uno maximal,
- obtenemos que todo conjunto consistente tiene una asignación.
- La contrarecípoca de lo anterior nos dice, si no existe asignación de Γ , entonces Γ es inconsistente.

Teorema de completitud

Teorema

Si $\Gamma \models P$, entonces $\Gamma \vdash P$.

Supongamos $\Gamma \models P$. Entonces no existe f de $\Gamma \cup \{\neg P\}$.

Entonces, por criterio de consistencia, $\Gamma \cup \{\neg P\}$ es inconsistente.

Por lo tanto $\Gamma \vdash P$.